

Döküman No	SİY.LS.02
Yayın Tarihi	01.01.2020
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	--
Sayfa No	1/1

NO	KULLANILAN İLAÇ	ETKİLEŞİMİ OLAN BESİNLER	ETKİLEŞİM SONUÇLARI
1	METİLPREDNİZALON	GREYFURT SUYU	İLACIN KAN KONSANTRASYONUNUN ARMASINA SEBEP OLUR
2	ANTİHİSTAMİNİKLER	ALKOL	MSS ÜSTÜNDEKİ ETKİLERİNİ ARTIRIR
3	BENZODİAPEZİNLER	ALKOL	MSS DE HİPNOTİK VE SEDATİF ETKİLERİNİ ARTIRIR
4	HİSTAMİN H2 RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ	ALKOL	MİDEDEKİ ADH BASKILAYAN İLAÇLAR KANDAKİ ALKOL DÜZEYİNİN BEKLENENDEN DAHA FAZLA OLMASINA YOL AÇAR
5	NSAİD (DİKLAFENAK, KETOPROFEN,NAPROKSİN)	ALKOL	GİS KANAMA RİSKİNİ ARTIRIR
6	OPIOİD (FENTALİN,MORFİN)	ALKOL	MSS ETKİLERİNİ ARTIRIR
7	TEOFİLİN	KAFEİN	KONVÜLSİYON,TREMOR,UYKUSUZLUK,BULANTI,KALP ÇARPINTISI GİBİ YAN ETKİLERİ ORTAYA ÇIKAR
8	TEOFİLİN	AŞIRI YAĞLI BESİNLER	EMİLİMİ ARTAR,KAN TEOFİLİN DÜZEYİNDEKİ ARTIŞA SEBEP OLUR, BAŞ AĞRISI ,KUSMA,BULANTI YAPAR
9	TEOFİLİN	PROTEİNCE ZENGİN BESİNLER	TEOFİLİN METABOLİZMASI ARTAR ,KAN DÜZEYİ DÜŞER
10	RANİTİDİN	KAFEİN	KAFEİN ETKİSİNİ ARTIRIR
11	FOROSEMİD	POTASYUM VE SODYUMCA ZENGİN BESİNLER	AŞIRI SODYUM ALIMI,SU VE POTASYUM KAYBINA VE ALEKTROLİT BOZUKLUĞUNA SEBEP OLUR

Hazırlayan :
Kalite Yönetim Direktörü

Onaylayan:
Başhekim